

阿拉善双峰驼驼羔饲养技术规范

Technical specifications for raising Alashan bactrian camel calves

地方标准信息服务平台

2024-07-15 发布

2024-08-15 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出。

本文件由内蒙古自治区畜牧业标准化技术委员会（SAM/C 19）归口。

本文件起草单位：阿拉善盟畜牧研究所、内蒙古自治区农牧业科学院、阿左旗沙日布日都金骆驼农牧民专业合作社、阿拉善盟农牧局综合保障中心、阿拉善盟农牧业综合行政执法支队、阿拉善左旗农牧业综合执法大队、阿拉善左旗统战宗教事务服务中心。

本文件主要起草人：焦兴刚、孙海洲、金鹿、羿静、爱东、焦靖杰、张辉、王筱珊、苏雪、王雨昕、朝鲁蒙、李志勇、曹明涛、陶格斯、陈杰、崔晨、布勒格、敖敦、刘强。

地方标准信息服务平台

阿拉善双峰驼驼羔饲养技术规范

1 范围

本文件规定了阿拉善双峰驼驼羔养殖的基本要求、饲养管理、断乳、选育、消毒防疫等内容。
本文件适用于阿拉善双峰驼养殖场、牧户。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26611 阿拉善双峰驼

NY 534 家畜用耳标及固定器

NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范

NY 5027 无公害食品 畜禽饮水水质

DB15/T 3570 阿拉善双峰驼主要牧草营养成分评定和日粮配制

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

驼羔 camel calf

从出生到断乳前的幼驼。

4 基本要求

4.1 场地要求

养殖场（户）建有驼羔饲养的圈舍、场地及基础设施。圈舍满足遮风遮雨、通风、干燥的基本要求。运动场要平坦平整、无尖锐异物并有遮阳设施按照NY/T 682的规定执行。料槽、饮水槽等设施的大小高低要适合驼羔。

4.2 饮用水要求

养殖过程中要保障自由饮水，水质应符合NY 5027的要求。

5 饲养管理

5.1 接生

驼羔出生后，及时用消毒后的纱布或毛巾将口腔、鼻腔里的黏液掏出擦净。对分娩困难的尽早采取人工辅助措施。对乏弱的驼羔及时加强管护。

5.2 断脐

驼羔出生后脐带一般会自然断裂。出生后脐带未断，应人工断脐，在距腹部8 cm~10 cm处剪断，断端消毒。

5.3 哺乳

5.3.1 自然哺乳

舍饲半舍饲条件下，驼羔出生后，清洗母驼乳头，挤出乳房内5 ml~10 ml乳汁后，3 h内吃到初乳；每日哺乳3~4次，每次不超2 h，其余时间母驼与驼羔分开。对泌乳量较高的母驼要早晚挤奶1次，防止驼羔过食，引起消化不良。

5.3.2 辅助哺乳

对母性不强的母驼进行人工辅助哺乳，促进母子建立自主哺育。具体方法为保定母驼的一条后腿，将母驼稍向前牵引，同时引导驼羔吃奶。

5.3.3 寄养哺乳

母驼产后缺奶或死亡，宜采取寄养方式。寄养时宜选择产期接近、母性强、奶量多、性情温顺的母驼。

5.3.4 人工哺乳

对寄养方式失败或母驼奶水不足的，驼羔宜采用人工哺乳的方式。人工哺乳首选新鲜驼奶，其次选驼羔专用代乳粉，人工哺乳要做到定时、定量、定温。

5.4 标识管理

驼羔出生2周后，脖子挂号牌、笼头上戴号牌或佩戴耳标等方式标识，号牌编码要与母驼成对应关系，同时做好母子记录。耳标编码按《畜禽标识和养殖档案管理办法》执行，佩戴按照NY 534的要求执行。

5.5 开食训练

驼羔出生2周后，训练吃饲草料，自由采食。

5.6 调教

驼羔出生后，逐步开展调教。调教前期采用腿部栓系，栓系时间每日不超3 h，经一周后，采用笼头栓系继续调教，直至完全适应栓系和牵拽。腿部栓系或笼头栓系时，驼羔间要留有适当距离，间距根据绳子长度确定。

5.7 分群饲养

泌乳母驼挤奶饲养模式下，驼羔要与母驼分群饲养，驼羔在母驼每次挤奶后可有1 h~2 h混放，其余时间要单独组群饲养，放牧时母驼与驼羔使用不同草场。

5.8 饲喂

驼羔1月龄后，少量、勤填逐步增加饲喂量。饲料及喂量按照DB15/T 3570的要求执行。

5.9 哺乳期管理

驼羔圈舍要干燥、通风、保温、清洁卫生，做好驼羔日常观察，发现异常及时诊断治疗。

6 断乳

6.1 断乳时间

舍饲半舍饲条件下，驼羔在13~14月龄断奶，放牧条件下，在16~18月龄断奶。

6.2 断乳方式

6.2.1 一次性断乳

将母驼与驼羔完全分群饲养；对不能分群饲养的，采用乳房罩等方式断乳。

6.2.2 逐渐断乳

逐渐减少驼羔吃奶次数和时间，经1周后，母驼与驼羔完全分群饲养。

6.3 断乳后管理

断乳后，要逐渐增加驼羔饲草料喂量，保障驼羔正常营养水平。公驼羔编入育成公驼群与母驼分群饲养；母驼羔根据饲养条件可分群饲养，也可与母驼群混合饲养。

7 选育

7.1 鉴定

在驼羔初生、周岁时进行鉴定，体型外貌应符合GB/T 26611的要求。

7.2 选留

采用系谱法、半同胞测定法等选留优良驼羔。留用数量要根据生产计划、牧场条件、市场状况等因素确定。对留作种用的，要单独组群，加强管理。

8 消毒与防疫

8.1 消毒

对驼羔圈舍内外环境、使用设备要及时清洁、定期消毒。人员、车辆进出圈舍按规定消毒，消毒方法按照NY/T 3075规定执行。

8.2 防疫

按《中华人民共和国动物防疫法》执行。

参 考 文 献

- [1] 畜禽标识和养殖档案管理办法
 - [2] 中华人民共和国动物防疫法
-

地方标准信息服务平台